

## Funcionalidade de indivíduos em atendimento no Município de Morro da Garça e Augusto de Lima: uma abordagem de acordo com o modelo WHODAS

Brenno Belchior Cordeiro da Silva<sup>1</sup>, Anna Izabel Alves da Silva Santos<sup>1</sup>, Ana Carolina Monteiro Lessa de Moura<sup>1</sup>, Ana Carolina Teixeira Venturato<sup>1</sup>, Brenda Souza Torres<sup>1</sup>, Carla Silva Alves Lacerda<sup>1</sup>, Carolina Nezes Rodrigues<sup>1</sup>, Daniela Sobral Pereira<sup>1</sup>, Delvair Peron Jungueira<sup>1</sup>, Eduardo Lima de Oliveira<sup>1</sup>, Jéssica Soares Feliciano<sup>1</sup>, Keetlen Janis Oliveira Fiuza<sup>1</sup>, Lucas Carneiro Morais<sup>1</sup>, Pollyana Helena Vieira Costa<sup>1</sup>, Tais Reis de Brito<sup>1</sup>, Janaine Cunha Polese<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil.

**Introdução:** Limitações em atividades e restrições na participação são achados importantes e comuns em indivíduos em regiões não metropolitanas. **Objetivo:** Traçar o perfil funcional dos indivíduos em atendimento durante o internato de saúde coletiva. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, onde foram avaliadas as seguintes variáveis de interesse: sexo, escolaridade, estado civil, atividade, moradia e questões que englobam cognição, mobilidade, auto-cuidado, relações interpessoais, atividades de vida, atividades escolares ou do trabalho e participação autorrelatadas pelo WHODAS 2.0. Estatística descritiva foi utilizada para avaliar as variáveis. **Resultados:** Quatorze indivíduos comunitários avaliados apresentaram média de idade de 72,64 anos, a mesma proporção entre sexos (50%), sua maioria casados (57,1%), apresentavam baixo grau de escolaridade

(4,64±3,34 anos). Questões relacionadas com mobilidade foram as que mais apresentaram extrema ou completa restrição, variando de 14,3 à 57,1. Outra variável que pode-se ressaltar foi relacionada a relações sexuais onde sete indivíduos (50%) relataram não praticar por dificuldades decorrentes de problemas de saúde. Questões relacionadas com atividades domésticas também apresentou restrição extrema ou completa, variando de 57,1 à 64,3%. **Conclusão:** A incapacidade funcional dos indivíduos avaliados está intimamente ligada em atividades domésticas e de mobilidade. A média observada no total do WHODAS foi de 84,36 ± 18,608.

**Palavras-chave:** WHODAS; Incapacidade; Função.

*Autor correspondente:*

*Brenno Belchior Cordeiro da Silva*

*E-mail: brenno.b2@hotmail.com*